


Formale Systeme

Prof. Dr. Bernhard Beckert

Fakultät für Informatik
Universität Karlsruhe (TH)



Winter 2008/2009



Fakten

1. Zu jeder aussagenlogischen Formel A gibt es eine logisch äquivalente in disjunktiver Normalform und ebenso eine logisch äquivalente in konjunktiver Normalform.
2. Die Algorithmen zur Herstellung beider Normalformen ergeben sich unmittelbar aus elementaren Tautologien.
3. Ist die Wahrheitstafel einer Formel gegeben, so lassen sich disjunktive und konjunktive Normalform aus dieser „direkt“ ablesen.
4. Disjunktive und konjunktive Normalform einer Formel sind nicht eindeutig.
5. Es gibt effiziente Methoden zur Minimierung von DNF und KNF.



Definition

1. Ein **Literal** ist ein Atom oder ein negiertes Atom
2. Eine Formel ist in **disjunktiver Normalform** (DNF), wenn sie Disjunktion von Konjunktionen von Literalen ist.
3. Eine Formel ist in **konjunktiver Normalform** (KNF), wenn sie Konjunktion von Disjunktionen von Literalen ist.



Beispiel zur exponentiellen Länge der KNF

Um zu prüfen, ob

$$A_n = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge \dots \wedge (\neg P_{n,1} \vee \neg P_{n,2})$$

eine Tautologie ist, wird die Unerfüllbarkeit von

$$\neg A_n = (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \vee \dots \vee (P_{n,1} \wedge P_{n,2})$$

geprüft. Die konjunktive Normalform von $\neg A_n$ ist:

$$\bigwedge \{P_{1,f(1)} \vee \dots \vee P_{n,f(n)} \mid f : 1, \dots, n \rightarrow 1, 2\}.$$



Für $n = 3$ ist das:

$$\begin{aligned} & (P_{1,1} \vee P_{2,1} \vee P_{3,1}) \wedge (P_{1,1} \vee P_{2,1} \vee P_{3,2}) \wedge \\ & (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}) \wedge (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,2}) \wedge \\ & (P_{1,2} \vee P_{2,1} \vee P_{3,1}) \wedge (P_{1,2} \vee P_{2,1} \vee P_{3,2}) \wedge \\ & (P_{1,2} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}) \wedge (P_{1,2} \vee P_{2,1} \vee P_{3,2}) \end{aligned}$$

In $\neg A_n$ treten $2 * n$ Literale auf, in der KNF $n * 2^n$.



Eingabe: $\neg A_n = \neg((\neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2}) \vee \dots \vee (\neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2}))$

1. Schritt (Einführung neuer Atome):

$$\begin{aligned} Q_1 & \leftrightarrow \neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2} \\ \dots & \dots \\ Q_i & \leftrightarrow \neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2} \\ \dots & \dots \\ Q_n & \leftrightarrow \neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2} \\ Q_{n+1} & \leftrightarrow Q_1 \vee Q_2 \\ Q_{n+2} & \leftrightarrow Q_{n+1} \vee Q_3 \\ \dots & \dots \\ Q_{2n-1} & \leftrightarrow Q_{2n-2} \vee Q_n \\ \neg A_n & \leftrightarrow \neg Q_{2n-1} \end{aligned}$$



2. Schritt (Auflösung der Äquivalenzen)

aus		wird
...		...
$Q_i \leftrightarrow \neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2}$		$\neg Q_i \vee (\neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2})$
...		\wedge
		$Q_i \vee P_{i,1} \vee P_{i,2}$
...		...
$Q_{n+1} \leftrightarrow Q_1 \vee Q_2$		$\neg Q_{n+1} \vee Q_1 \vee Q_2$
...		\wedge
		$Q_{n+1} \vee \neg(Q_1 \vee Q_2)$
...		...
$Q_{2n-1} \leftrightarrow Q_{2n-2} \vee Q_n$		$\neg Q_{2n-1} \vee Q_{2n-2} \vee Q_n$
		\wedge
		$Q_{2n-1} \vee \neg(Q_{2n-2} \vee Q_n)$
$\neg A_n$		$\neg Q_{2n-1}$



3. Schritt (konjunktive Normalform):

aus		wird
...		...
$\neg Q_i \vee (\neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2})$		$(\neg Q_i \vee \neg P_{i,1}) \wedge (\neg Q_i \vee \neg P_{i,2})$
$Q_i \vee P_{i,1} \vee P_{i,2}$		$Q_i \vee P_{i,1} \vee P_{i,2}$
...		...
$\neg Q_{n+1} \vee Q_1 \vee Q_2$		$\neg Q_{n+1} \vee Q_1 \vee Q_2$
$Q_{n+1} \vee \neg(Q_1 \vee Q_2)$		$(Q_{n+1} \vee \neg Q_1) \wedge (Q_{n+1} \vee \neg Q_2)$
...		...
$\neg Q_{2n-1} \vee Q_{2n-2} \vee Q_n$		$\neg Q_{2n-1} \vee Q_{2n-2} \vee Q_n$
$Q_{2n-1} \vee \neg(Q_{2n-2} \vee Q_n)$		$(Q_{2n-1} \vee \neg Q_{2n-2}) \wedge (Q_{2n-1} \vee \neg Q_n)$
$\neg A_n$		$\neg Q_{2n-1}$



Konstruktion der kurzen KNF

Konkretes Beispiel

Eingabe: $A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$

Berechne KNF für $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$



Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

3. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$(Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$(Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$(Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2})$$

$$(\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$(\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$



Satz

Theorem

Zu jeder aussagenlogischen Formel A mit n Literalvorkommen gibt es eine konjunktive Normalform A_{kknf} , so dass

1. A ist erfüllbar gdw A_{kknf} erfüllbar ist.
2. A_{kknf} enthält höchstens $c * n$ Literalvorkommen für eine von n unabhängige Konstante c .

